



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Pessoal
Centro de Recrutamento e Seleção de Praças



CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO INGRESSO DE NOVOS OFICIAIS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / 2010

PROVA

CATEGORIA PROFISSIONAL	ESPECIALIDADE
MÉDICA	REUMATOLOGIA

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES:

- Você receberá do fiscal o seguinte material:
 - 01 (UM) **CADERNO DE PROVAS** contendo 55 (CINQUENTA E CINCO) questões, sendo 50 (CINQUENTA) **OBJETIVAS** e 05 (CINCO) **DISCURSIVAS**, e 04 (QUATRO) páginas para serem utilizadas como rascunho.
 - 01 (UM) **CARTÃO-RESPOSTA** destinado à marcação das respostas da prova **OBJETIVA**.
- Verifique se esse material está em ordem; caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
- No **CARTÃO-RESPOSTA**, a marcação das letras correspondentes às respostas corretas deve ser feita de modo a cobri-las completamente.

Exemplo: 25. (A) (■) (C) (D)
- Utilize caneta esferográfica azul ou preta para marcar as respostas **OBJETIVAS** no **CARTÃO-RESPOSTA** e para responder às questões **DISCURSIVAS**.
- O preenchimento do **CARTÃO-RESPOSTA** com rasuras implicará a perda da questão correspondente; logo, **EVITE RASURAS**.
- Tenha muito cuidado com o **CARTÃO-RESPOSTA**, para não o dobrar, amassar ou manchar.
- Tenha muito cuidado com o **CADERNO DE PROVAS**, para não o danificar, rasgar ou descaracterizar.
- Para cada uma das questões **OBJETIVAS**, são apresentadas 04 (QUATRO) opções, classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar 01 (UMA) resposta. A marcação em mais de uma opção implicará a perda da questão, **MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA**.
- As questões **DISCURSIVAS** devem ser respondidas no espaço a elas reservado. Não serão corrigidas ou consideradas quaisquer anotações ou respostas que estejam em lugares não destinados para a solução da questão.
- Quando terminar, entregue ao fiscal o **CARTÃO-RESPOSTA** e o **CADERNO DE PROVAS** devidamente assinados.
- O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTA PROVA É DE 5 (CINCO) HORAS.

ATENÇÃO

O NÃO PREENCHIMENTO CORRETO DO CARTÃO-RESPOSTA IMPLICARÁ A PERDA DA QUESTÃO CORRESPONDENTE.

Boa Sorte!

Nome do Candidato:

Assinatura do Candidato	
-------------------------------	--

**POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO****Diretoria Geral de Pessoal****Centro de Recrutamento e Seleção de Praças****CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO
INGRESSO DE NOVOS OFICIAIS DE SAÚDE DA POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / 2010****PROVA****CATEGORIA PROFISSIONAL****ESPECIALIDADE****MÉDICA****REUMATOLOGIA****OBJETIVAS****Questão 01**

No exame físico de uma paciente jovem com queixa de dor na abdução do polegar, o teste semiológico que se impõe é o de

- (A) Appley.
- (B) Finkelstein.
- (C) Phalen.
- (D) Nery.

Questão 02

A manobra semiológica que inclui os movimentos de abdução, flexão e rotação externa do quadril também é conhecida como teste de

- (A) Trendelenburg.
- (B) Thomas.
- (C) Ober.
- (D) Patrick Fabere.

Questão 03

Consideramos o ângulo Q (patelar) anormal, quando superior a

- (A) 15°.
- (B) 20°.
- (C) 25°.
- (D) 30°.

Questão 04

Em relação aos achados radiológicos encontrados na artrite reumatoide, podemos afirmar que

- (A) no pé, a primeira erosão consoma ser observada na cabeça do primeiro metatarso.
- (B) no punho, o acometimento precoce do processo estilóide é raro.
- (C) no quadril, a protusão acetabular e a ausência de reparo ósseo são características.
- (D) no ombro, a subluxação ocorre precocemente.

Questão 05

A presença de quadratura vertebral é um sinal radiológico encontrado na

- (A) espondilodiscite.

- (B) osteoartrose de coluna.
- (C) espondilite anquilosante.
- (D) doença de Forestier.

Questão 06

Paciente portadora de lúpus eritematoso sistêmico há 20 anos, já com acometimento renal, apresenta marcha claudicante e dor na coxa direita há 1 ano.

O achado radiológico mais provável a ser encontrado é

- (A) osteopenia justa-articular no quadril.
- (B) espondilólise na coluna lombar.
- (C) esclerose óssea e redução da interlinha articular no quadril.
- (D) espondilolistese na coluna.

Questão 07

Dentre os prováveis mecanismos de ação da Colchicina, é destacada sua ação sobre a

- (A) inibição direta da síntese de IL-6.
- (B) inibição da fagocitose e quimiotaxia de neutrófilos.
- (C) inibição direta da síntese de IL-1.
- (D) inibição direta da via de COX-1.

Questão 08

Para uma dose de 5 mg de Prednisona, teremos como equivalente:

- (A) 0,75 mg de Dexametasona.
- (B) 25 mg de Hidrocortisona.
- (C) 20 mg de Cortisona.
- (D) 15 mg de Hidrocortisona.

Questão 09

Em relação ao acometimento pulmonar da artrite reumatoide, pode-se afirmar que

- (A) a fibrose intersticial é mais encontrada nos ápices pulmonares.
- (B) os achados clínicos são mais frequentes do que os histopatológicos.

- (C) a mortalidade por doença pulmonar na artrite reumatoide é duas vezes maior do que na população sem artrite reumatoide.
- (D) o derrame pleural é encontrado em cerca de 50% dos casos.

Questão 10

Na artrite reumatoide, a manifestação ocular mais frequente é

- (A) esclerite.
- (B) episclerite.
- (C) cetoconjuntivite seca.
- (D) escleromalácia.

Questão 11

A vasculite reumatoide apresenta algumas características específicas, tal (tais) como:

- (A) acometimento mais frequente nos médios vasos.
- (B) associação com o HLA-DR8 positivo.
- (C) acometimento renal não é raro.
- (D) aspectos histopatológicos iniciais demonstram necrose fibrinoide vascular, com infiltrado de células inflamatórias.

Questão 12

Em relação ao quadro clínico da amiloidose, é correto afirmar que

- (A) a neuropatia está presente em cerca de 40% dos pacientes.
- (B) a cardiomiopatia é uma complicação rara.
- (C) pode ocorrer depósito amiloide periarticular.
- (D) a hipertensão arterial sistêmica é um achado precoce.

Questão 13

É critério para o diagnóstico de doença mista do tecido conjuntivo:

- (A) edema de mãos e pés.
- (B) miopatia distal.
- (C) sinovite.
- (D) fator anti-nuclear (FAN) positivo.

Questão 14

Em relação à produção de autoanticorpos encontrados na esclerodermia, é correto afirmar que

- (A) anticorpos antinucleares estão presentes em cerca de 50% dos pacientes.
- (B) anticorpos antitopoisomerase 1 possuem alta especificidade para doença.
- (C) o isotipo de anticorpos antinucleares são, preferencialmente, do tipo IgM.
- (D) Anticorpos anticentrômero possuem baixa especificidade para doença.

Questão 15

Em um paciente do sexo masculino que apresenta quadro de artralgia, isquemia de quarto pododáctilo de pé esquerdo, monoreurite múltipla e hipertensão arterial sistêmica, a principal hipótese diagnóstica é

- (A) lúpus eritematosos sistêmico.
- (B) poliarterite nodosa.
- (C) granulomatose de Wegener.
- (D) vasculite reumatoide.

Questão 16

Mulher 66 anos, há 3 anos com dor na base do polegar direito. Refere que a dor é mais intensa quando faz tricô e crochê. Ao exame apresenta também aumento de IFPs de ambas as mãos de consistência dura.

Qual hipótese diagnóstica mais provável?

- (A) Rizartrose.
- (B) Tendinite de De Quervain.
- (C) Artrite soro-negativa.
- (D) Artrite reumatoide.

Questão 17

É correto afirmar em relação à Doença de Forestier:

- (A) Ocorre mais frequentemente antes dos 45 anos de idade.
- (B) Acomete preferencialmente o sexo feminino.
- (C) O acometimento das enteses é frequente.
- (D) O VHS aumentado é um marcador laboratorial de atividade de doença.

Questão 18

A meralgia parestésica ocorre por compressão do nervo

- (A) cutâneo-femural.
- (B) tibial posterior.
- (C) tibial anterior.
- (D) ulnar.

Questão 19

A localização mais frequente do Neuroma de Morton é entre

- (A) a primeira e segunda cabeça dos metatarsos.
- (B) a segunda e terceira cabeça dos metatarsos.
- (C) a terceira e quarta cabeça dos metatarsos.
- (D) a quarta e quinta cabeça dos metatarsos.

Questão 20

Em relação ao quadro clínico da febre reumática, é correto afirmar que

- (A) o quadro articular se mostra mais severo em adultos jovens do que em crianças.
- (B) a cardiomegalia é uma manifestação radiológica rara do acometimento cardíaco.
- (C) os nódulos subcutâneos geralmente são maiores que 2 cm.
- (D) a válvula mitral é a segunda mais frequentemente acometida no comprometimento valvular.

Questão 21

Assinale a lesão cutânea encontrada na doença de Behçet.

- (A) Rash.
- (B) Lesões papulopustulosas.
- (C) Alopecia.
- (D) Nódulos subcutâneos indolores.

Questão 22

Em relação aos efeitos adversos das infiltrações com corticosteroides, é correto afirmar que

- (A) o Flushing facial pode durar mais de uma semana.
- (B) a infecção é uma complicação rara.
- (C) a hipopigmentação cutânea é irreversível.
- (D) a sinovite pós-infiltração – por cristais de corticosteroides, ocorre em cerca de 30% dos casos.

Questão 23

Mielossupressão, desordens mieloproliferativas, malignidade e cistite hemorrágica são efeitos adversos encontrados com o uso de

- (A) metotrexato.
- (B) azatioprina.
- (C) ciclosporina A.
- (D) ciclofosfamida.

Questão 24

São achados clínicos encontrados na doença de Kawasaki, EXCETO

- (A) febre por 5 dias ou mais.
- (B) hiperemia conjuntival unilateral.
- (C) exantema polimorfo.
- (D) linfadenomegalia cervical não purulenta.

Questão 25

Em relação à granulomatose de Wegener, é correto afirmar que

- (A) acomete preferencialmente pacientes acima dos 40 anos de idade.
- (B) acomete preferencialmente o sexo feminino em uma proporção de 5 mulheres para 1 homem.
- (C) a glomerulonefrite é encontrada em cerca de 30% dos pacientes.
- (D) o acometimento neurológico está presente em mais 60% dos casos.

Questão 26

Qual dos exames abaixo apresenta maior especificidade para o diagnóstico?

- (A) Velocidade de Hemossedimentação – VHS.
- (B) Anti-CCP.
- (C) FAN -Fator Antinuclear.
- (D) Fator Reumatoide.

Questão 27

Em qual das condições abaixo é maior a sensibilidade do exame FAN- Fator Antinuclear – para o diagnóstico?

- (A) Lúpus eritematoso sistêmico.
- (B) Vasculite reumatoide.
- (C) Síndrome de Sjogren.
- (D) Colangite autoimune primária.

Questão 28

Num paciente com artroplastia total de quadril e infecção 6 meses após a cirurgia na prótese articular, qual o micro-organismo frequentemente mais encontrado?

- (A) Hemofilus Influenza.
- (B) Bacilo Gram Negativo.
- (C) Estreptococos.
- (D) Estafilococos Coagulase Negativo.

Questão 29

Pode-se afirmar que, na profilaxia da tuberculose em pacientes que precisam usar terapia Anti TNF,

- (A) o teste do PPD acima de 5 mm contraindica essa terapia.
- (B) o RX de tórax deve ser solicitado sempre que o PPD for superior a 5 mm.
- (C) deve-se administrar isoniazida a todos os pacientes com PPD superior a 10 mm.
- (D) deve-se solicitar PPD e RX de tórax para todos os pacientes com indicação para terapia Anti TNF, inclusive para os portadores de espondilite anquilosante.

Questão 30

Qual dos seguintes medicamentos deve ser evitado em pacientes lúpicas com doença ativa e grávidas?

- (A) Micofenolato Mofetil.
- (B) Azatioprina.
- (C) Hidroxicloroquina.
- (D) Prednisona.

Questão 31

Pode-se afirmar a respeito da osteoartropatia hipertrófica primária que

- (A) está relacionada a tumor hipofisário.
- (B) ocorre frequentemente associada à doença pulmonar crônica.
- (C) é uma síndrome paraneoplásica.
- (D) resulta da mutação do gene para a enzima 15 – Hidroxiprostaglandina Desidrogenase.

Questão 32

Num paciente hipertenso com hiperuricemia assintomática e ácido úrico entre 7,0 e 8,0 mg/dl, qual a medida terapêutica indicada?

- (A) Colchicina em doses baixas.
- (B) Droga Uricosúrica.
- (C) Inibidor da Xantina Oxidase.
- (D) Não tratar a hiperuricemia.

Questão 33

Qual a causa mais comum de monoartrite aguda no idoso?

- (A) Osteoartrite.
- (B) Pseudogota (Artrite por cristais de pirofosfato de cálcio).

- (C) Artrite infecciosa.
- (D) Fratura por osteoporose.

Questão 34

Qual dos seguintes medicamentos não causa aumento de perda óssea?

- (A) Ácido acetil salicílico em dose superiores a 3,0 gr/dia.
- (B) Heparina.
- (C) Furosemida.
- (D) Litium.

Questão 35

É uma indicação para realização de densitometria óssea:

- (A) Homem com idade igual ou superior a 60 anos.
- (B) Mulher com idade superior a 65 anos.
- (C) Menopausa.
- (D) Tabagismo.

Questão 36

Qual a manifestação musculoesquelética que não está associada a diabetes ?

- (A) Síndrome do túnel do carpo.
- (B) Capsulite adesiva do ombro.
- (C) Contratura de Dupuytren.
- (D) Síndrome de hipermotilidade articular.

Questão 37

Qual manifestação clínica é frequente em pacientes com osteomalácia?

- (A) Hipercalcemia.
- (B) Dor óssea.
- (C) Monoartrite.
- (D) Condrocálcinose Articular.

Questão 38

Qual o método mais sensível para diagnosticar Entesite?

- (A) Ressonância nuclear magnética.
- (B) Tomografia computadorizada.
- (C) Ultrassonografia.
- (D) Cintigrafia óssea.

Questão 39

Qual o medicamento recomendado para uma paciente com 40 anos, feminina, com dor generalizada, há 6 meses, acima e abaixo da cintura, bilateral?

- (A) Paracetamol.
- (B) Anti-inflamatório não hormonal.

- (C) Amitriptilina.
- (D) Predinisona.

Questão 40

Qual o melhor exame para monitorar o acometimento renal no lúpus eritematoso sistêmico e as recidivas após remissão?

- (A) Exame de análise da urina – EAS.
- (B) Exame da urina de 24 horas – Proteinúria e Clearance de Creatinina.
- (C) Acompanhamento dos níveis séricos de Anti DNA e do complemento.
- (D) Biópsia renal.

Questão 41

Qual o melhor esquema terapêutico para pacientes lúpicas grávidas com Glomerulonefrite Membranoproliferativa?

- (A) Pulsoetrapia com Corticoide e com Ciclofosfamida.
- (B) Corticoide + Micofenolato Mofetil.
- (C) Rituximabe.
- (D) Corticoide + Azatioprina.

Questão 42

Em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico, qual manifestação musculoesquelética não deve ser esperada?

- (A) Osteonecrose.
- (B) Tenossinovite.
- (C) Artrite séptica.
- (D) Condrocálcinose.

Questão 43

Num paciente com síndrome de Sjogren, qual das seguintes manifestações é mais comum?

- (A) Glomerulonefrite.
- (B) Fenômeno de Raynaud.
- (C) Artrite erosiva.
- (D) Vasculite.

Questão 44

Qual dos seguintes índices avalia o grau de lesões crônicas em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico?

- (A) Bilag.
- (B) Sledai.
- (C) SLICC / ACR.
- (D) SF-36.

Questão 45

Em qual dos seguintes tumores é esperado ocorrer metástases blásticas?

- (A) Tumor renal.
- (B) Tumor de tireoide.

- (C) Tumor de mama.
- (D) Mieloma múltiplo.

Questão 46

O teste de elevação da perna estendida é sugestivo de radiculopatia do nervo ciático quando provoca dor

- (A) na face posterior da coxa, após 30 graus de elevação.
- (B) na face anterior da perna, após 70 graus de elevação.
- (C) na nádega, entre 30 e 70 graus de elevação.
- (D) na face posterior da perna, após 30 graus de elevação.

Questão 47

Pode-se afirmar em relação à síndrome do túnel do carpo que

- (A) os sintomas pioram com os movimentos da mão.
- (B) a atrofia tênar é um achado precoce.
- (C) a eletromiografia é o principal exame para o diagnóstico.
- (D) sempre que tem início bilateral deve-se pesquisar uma doença sistêmica associada.

Questão 48

Em paciente com radiculopatia cervical,

- (A) a manobra de Spurling é realizada com a flexão da coluna cervical e inclinação da cabeça para o lado da dor.
- (B) o teste de Bragard sugere a presença de hérnia cervical.
- (C) a abdução do membro superior do lado da dor acima da cabeça causa alívio dos sintomas.
- (D) a tração cervical manual causa redução nos reflexos profundos do lado comprometido.

Questão 49

Qual das seguintes condições clínicas está associada à baixa massa óssea?

- (A) Obesidade.
- (B) Hipertensão arterial.
- (C) Osteoartrite.
- (D) Doença celíaca.

Questão 50

Qual das seguintes estratégias anticitocinas é utilizada para o tratamento de doenças reumáticas?

- (A) Aplicação do receptor solúvel do TNF ALFA.
- (B) Aplicação do anticorpo monoclonal anti-interleucina 6.
- (C) Aplicação do anticorpo monoclonal antirreceptor de TNF ALFA.
- (D) Aplicação do anticorpo monoclonal anticélula T.

DISCURSIVAS

Questão 01

Paciente, sexo masculino, 48 anos, apresenta quadro de dor aguda no joelho esquerdo. Obeso, hipertenso, usuário de 50 mg de hidroclorotiazida/dia e AAS 100 mg/dia. Ao exame, apresenta-se com estado geral preservado, afebril e claudicante. O exame articular revela dor, aumento de volume, calor e discreto rubor no joelho esquerdo.

Pergunta-se:

- Qual a principal hipótese diagnóstica?
- Qual o exame diagnóstico que deveria ser solicitado e o achado encontrado?
- Confirmado o diagnóstico principal, qual seria a conduta terapêutica de momento?

[illegible]

Questão 02

Descreva os critérios diagnósticos utilizados nas espondiloartropatias (European Spondyloarthropathy Study Group - ESSG).

[illegible]

Questão 03

A.T.S, 43 anos, sexo feminino, casada, do lar, apresenta poliartrite fixa em articulações das mãos e punhos há 6 semanas. Seu medico solicitou exames que revelaram fator reumatoide =1/40 por nefelometria e fan + 1/40,VHS = 60 mm.

Pergunta-se:

- Quais os diagnósticos prováveis?
- Que exames poderiam auxiliar no diagnóstico e por quê?
- Qual seria seu tratamento inicial e como você avaliaria a resposta dessa paciente ao tratamento?
- Quais as opções terapêuticas para essa paciente, e quando você utilizaria medicamentos mais potentes?

Questão 04

Uma paciente com 50 anos apresenta dor lombar irradiada para membro inferior direito, associada à parestesia na face lateral da perna direita há 5 dias, provocada por esforço ao trocar pneu. A dor piora com a flexão da coluna lombar e com a elevação passiva do membro inferior direito.

Pergunta-se:

- a) Qual o diagnóstico provável?
- b) Que exames poderiam esclarecer o diagnóstico?
- c) Qual o tratamento recomendado?
- d) Que condições clínicas indicariam cirurgia imediatamente?

--

Questão 05

Dona Maria das Dores tem 42 anos e há 5 anos apresenta dor generalizada e astenia. Já procurou diversos ortopedistas e reumatologistas, porém os inúmeros exames solicitados foram normais.

Pergunta-se:

- Qual (Quais) seria(m) o(s) diagnóstico(s) provável (prováveis) ?
- Qual abordagem terapêutica seria recomendável?
- Como você explicaria à paciente e a seus familiares que ela pode ter dor apesar de os exames estarem sempre normais?

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. In the bottom right corner, there is a small rectangular box, likely intended for a signature or stamp. The paper appears to be a standard sheet of lined notebook paper.

Rascunho

Rascunho

Rascunho

Rascunho