


LÍNGUA PORTUGUESA	
Instrução: As questões de 1 a 5 correspondem ao texto abaixo. Tecendo a manhã (João Cabral de Melo Neto) 1 <i>Um galo sozinho não tece uma manhã: ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro; de um outro galo que apanhe o grito que um galo antes e o lance a outro; e de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que a manhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo, entre todos os galos.</i> 2 <i>E se encorpando em tela, entre todos, se erguendo tenda, onde entrem todos, se entretendendo para todos, no toldo (a manhã) que plana livre de armação. A manhã, toldo de um tecido tão aéreo que, tecido, se eleva por si: luz balão.</i>	
1. A partir da leitura de todo o poema, depreende-se que ele apresenta (A) a maneira como os galos gritam nas manhãs a fim de fazer com que todos acordem. (B) um fato sem importância que aconteceu em uma manhã qualquer. (C) um trabalho individualizado e que não tem um produto final. (D) a construção solidária de um objeto, de uma obra ou de uma nova sociedade.	5. Na oração <i>Um galo sozinho não tece uma manhã</i>, a palavra em destaque tem a função sintática de (A) sujeito. (B) adjunto adnominal de negação. (C) adjunto adverbial de negação. (D) objeto direto.
2. O provérbio que se aplica ao poema é (A) de grão em grão a galinha enche o papo. (B) uma andorinha só não faz verão. (C) cada um por si e Deus por todos. (D) quando um não quer dois não brigam.	6. No período <i>Como havia muitas pessoas na sala, fiquei sufocada</i>, a palavra como é uma conjunção subordinativa (A) comparativa. (B) proporcional. (C) conformativa. (D) causal.
3. O poema apresenta basicamente as seguintes oposições: (A) individualidade × coletividade e dependência × autonomia. (B) trabalho × ócio e solidariedade × individualidade. (C) produtividade × improdutividade e independência × insegurança. (D) capacidade de criação × falta de criatividade e atividade × inatividade.	Instrução: Nas questões 7 e 8, assinale a alternativa que preenche corretamente, pela ordem, as lacunas dos períodos apresentados. 7. A documentação que _____ nesta tarde está completa, acabei de _____. Amanhã bem cedo, como combinamos anteriormente, _____ ao _____. (A) me enviaram; conferi-la; Devolvê-la-ei; Avisem-me; recebê-la. (B) me enviaram; a conferir; Devolvê-la-ei; Me avisem; recebê-la. (C) enviaram-me; conferir-la; Devolverei-a; Avisem-me; receber-la. (D) enviaram-me; conferi-la; A devolverei; Me avisem; recebê-la.
4. Em entretendendo (entretender), nota-se a presença das palavras (A) entender; tenda; estender; entreter. (B) entre; tenda; entender; tender. (C) entre; entristecer; depender; tender. (D) entretenimento; entendimento; tendência; distender.	8. Devo ir _____ Curitiba _____ trabalho na próxima semana. A empresa aérea acabou de confirmar que meu voo sai _____ 5 horas da tarde do Aeroporto de Confins. _____ vezes costumo me atrasar, sairei de casa mais cedo _____ fim de não perder o voo. (A) à; a; às; As; à (B) à; à; às; Às; a (C) a; a; às; Às; a (D) a; a; as; Às; à
	9. A sequência em que todas as palavras têm as sílabas separadas corretamente é (A) ca-ó-ti-co; nos-tal-gia; ex-ce-ção; tungs-tê-nio. (B) ab-so-lu-to; sa-í-da; fi-el; gar-ra-fa. (C) re-fle-xão; a-bru-pto; fe-no-lfta-le-í-na; p-si-co-se. (D) m-ne-mô-ni-co; Má-ri-o; coor-de-nar; sub-lu-nar.
	10. Todas as palavras estão acentuadas corretamente e recebem acento gráfico por seguirem a mesma regra de acentuação em (A) ítem; também; armazéns; contém. (B) Jáú; balaústre; Pacaembú; baú. (C) calvície; mágoas; errôneos; imundície. (D) desejá-los; ímã; atrás; saída.

11. Todas as palavras estão corretamente grafadas em (A) aleijar; problema; supertição; etmologia. (B) carangueijo; propriedade; beneficiência; ponteagudo. (C) bugiganga; cataclisma; borburiño; surrupiar. (D) apropriado; astigmatismo; supetão; braguilha.	ESPECIALIDADE 16. Paciente, 75 anos de idade, com infarto extenso do miocárdio, é admitido na sala de cirurgia para revascularização do miocárdio de urgência. Apresenta os seguintes parâmetros hemodinâmicos: pressão arterial média de 60 mmHg, pressão venosa central de 14 mmHg e pressão capilar pulmonar de 28 mmHg. Esses valores são compatíveis com (A) hipovolemia. (B) falência de ventrículo esquerdo. (C) falência de ventrículo direito. (D) choque anafilático.
12. Todas as palavras são formadas por hibridismo em (A) passatempo; automóvel; embora; zunzum. (B) endovenosa; televisão; microondas; alcalóide. (C) monocultura; cilindriforme; amoroso; ajoelhar. (D) escriturário; desamor; leiteiro; biodança.	
13. O uso de vírgula está INCORRETO em: (A) Se ela comprar um carro novo, ficará endividada. (B) A mulher, naquela hora, estava no quarto e o marido saía de casa. (C) É interessante, a oferta mas não tenho o dinheiro necessário. (D) No meio da confusão, a criança.	17. Das situações apresentadas abaixo, a realização de herniorrafia inguinal ambulatorial sob anestesia geral está contra-indicada em paciente (A) homem de 33 anos de idade, com diabetes controlada com insulina. (B) mulher de 42 anos de idade, sedentária, sem outras doenças. (C) recém-nascido prematuro, com idade pós-conceptual de 44 semanas. (D) homem de 62 anos de idade, hipertenso, controlado com hidroclorotiazida.
14. As orações em destaque: <i>Esperamos que o novo chefe cumpra seu dever.</i> <i>Como estava chateada, não saí de casa.</i> Estão corretamente classificadas, respectivamente, em (A) oração subordinada substantiva objetiva direta e oração subordinada adverbial causal. (B) oração subordinada substantiva objetiva indireta e oração subordinada adverbial causal. (C) oração subordinada substantiva completiva nominal e oração coordenada sindética explicativa. (D) oração subordinada substantiva subjetiva e oração subordinada adverbial final.	18. Um paciente de 70 kg recebe uma unidade de plaquetas. Seu número de plaquetas aumentará de (A) 1.000 a 1.500 plaquetas / mm³ (B) 2.000 a 4.000 plaquetas / mm³ (C) 5.000 a 10.000 plaquetas / mm³ (D) 20.000 a 30.000 plaquetas / mm³
15. Ao relacionar a coluna da direita com a da esquerda, numerando as figuras de linguagem, a sequência correta é I. Eles, o seu único desejo é exterminar-nos. (Garret) 1. pleonasmo II. Maria embarcou em um avião gigantesco. 2. anacoluto III. Li Machado de Assis ainda no ginásio. 3. metonímia IV. A mulher não acreditava naquilo que seus próprios olhos viam. 4. catacrese (A) I-2 ; II-4 ; III-3 ; IV-1 (B) I-2 ; II-4 ; III-1 ; IV-3 (C) I-3 ; II-1 ; III-4 ; IV-2 (D) I-3 ; II-2 ; III-4 ; IV-1	19. A curva de capnografia abaixo é característica da seguinte situação clínica:  (A) oscilação cardiogênica. (B) baixo débito cardíaco. (C) hiperventilação. (D) reinalação.

20. Paciente, sexo masculino, 67 anos de idade, está sendo submetido à hemicolectomia esquerda por carcinoma de cólon sob anestesia geral. Possui antecedente de insuficiência cardíaca congestiva (ICC) classe funcional I (New York Heart Association). Após indução anestésica suave com propofol e fentanil, e intubação sem intercorrências com succinilcolina, a anestesia está sendo mantida com óxido nitroso (66%), oxigênio (33%), isoflurano (1,5%) e vecurônio. Após 30 minutos de cirurgia, é solicitada mudança no posicionamento da mesa cirúrgica, colocando-a em posição de Trendelenburg. A saturação periférica da hemoglobina monitorizada pela oximetria de pulso se reduz de 99% para 92% rapidamente. A ausculta pulmonar revela murmúrio vesicular diminuído em pulmão esquerdo. A sonda de intubação é reposicionada, porém sem melhora da ausculta. É realizada uma radiografia de tórax que mostra a imagem abaixo.



A melhor hipótese diagnóstica e a conduta a ser adotada, respectivamente, são

- (A) pneumotórax e drenagem do hemitórax esquerdo.
- (B) descompensação da ICC e uso de furose-mida.
- (C) atelectasia e manobra de recrutamento alveolar.
- (D) pneumonia e antibioticoterapia.
21. Opióide de ação ultracurta, com meia vida de eliminação inferior a 10 minutos, metabolizado por esterases plasmáticas inespecíficas refere-se a
- (A) alfentanil.
- (B) remifentanil.
- (C) sufentanil.
- (D) fentanil.
22. O sulfato de magnésio é indicado para tratamento de convulsões na paciente obstétrica com eclâmpsia. Das situações apresentadas abaixo, aquela que indica concentração plasmática de magnésio elevada com risco de toxicidade é
- (A) hiper-reflexia patelar.
- (B) nova convulsão, após início da terapêutica com sulfato de magnésio.
- (C) diminuição do débito urinário.
- (D) elevação da pressão arterial, após dose de ataque.
23. A condição clínica que retarda o metabolismo plasmático do atracúrio é
- (A) hipotermia.
- (B) hipoglicemia.
- (C) hipernatremia.
- (D) alcalose metabólica.
24. A adição de 5 cm de H₂O de pressão positiva no final da expiração (PEEP) em paciente anestesiado, sob ventilação controlada mecânica, promove
- (A) diminuição do *shunt* intrapulmonar.
- (B) aumento do risco de volutrauma.
- (C) diminuição da complacência pulmonar.
- (D) piora da oxigenação.
25. Paciente, 20 anos de idade, sofreu um acidente automobilístico, desenvolvendo contusão fronto-temporal direita e lesão axonal difusa. Na sala de emergência apresentava Glasgow de 7, sendo intubado, levado para o centro cirúrgico e instalado cateter de monitorização da pressão intracraniana (PIC). No 4º dia de evolução, o paciente está na UTI, em ventilação mecânica, sedado com midazolam 15 mg/h e fentanil 450 mcg/h. Faz tomografia computadorizada de crânio que evidencia pequena hemorragia subaracnóidea. É trazido para o centro cirúrgico para craniotomia, apresentando os seguintes parâmetros: PIC = 12 mmHg, PAM = 85 mmHg, gasometria arterial com pH = 7,47, pO₂ = 135 mmHg, pCO₂ = 25 mmHg, SO₂ = 98% (FiO₂ = 40%), BE = 0, Bic = 23 mEq/l.
- Dados:
PIC – pressão intracraniana
PAM – pressão arterial média.
- Nesse caso, o diagnóstico e a melhor conduta, respectivamente, são
- (A) hipertensão intracraniana e infundir manitol 20% 1 g/kg endovenoso em 30 minutos.
- (B) acidose metabólica e administrar bicarbonato de sódio 1mEq/kg.
- (C) alcalose respiratória e reduzir o volume minuto.
- (D) diminuição da pressão de perfusão cerebral e introduzir noradrenalina 0,5 mcg/kg/minuto.
26. A composição da solução de Ringer com lactato é
- (A) Na⁺ = 154 mEq/l ; Cl⁻ = 154 mEq/l
- (B) Na⁺ = 154 mEq/l ; Cl⁻ = 154 mEq/l ; lactato = 28 mEq/l
- (C) Na⁺ = 154 mEq/l ; Cl⁻ = 154 mEq/l ; K⁺ = 4 mEq/l ; Ca⁺² = 3 mEq/l ; lactato = 28 mEq/l
- (D) Na⁺ = 130 mEq/l ; Cl⁻ = 109 mEq/l ; K⁺ = 4 mEq/l ; Ca⁺² = 3 mEq/l ; lactato = 28 mEq/l

27. Paciente durante ressecção transuretral de próstata evolui com hiponatremia. É sabido que a correção do sódio plasmático não deve ser muito rápida pelo risco de mielinólise pontina. A velocidade máxima de correção do sódio plasmático é (A) 0,25 mEq/l/h (B) 0,50 mEq/l/h (C) 1,75 mEq/l/h (D) 2,00 mEq/l/h	35. Durante a anestesia, em paciente de um ano de idade com 9 kg que ficou em jejum para cirurgia por 8 horas, o déficit hídrico estimado pelo tempo de jejum será (A) 432 ml (B) 288 ml (C) 144 ml (D) 72 ml
28. A vantagem do uso de colóide em relação aos cristalóides para expansão volêmica é (A) menor volume necessário. (B) menor risco de coagulopatia. (C) menor pressão osmótica. (D) menor custo.	36. Com relação ao uso dos antiinflamatórios não hormonais para tratamento de dor pós-operatória, pode-se afirmar que (A) bloqueiam a ciclooxigenase (COX), aumentando a conversão do ácido aracdônico em prostaglandinas e prostacilinas. (B) a administração por via venosa não causa efeitos colaterais gastrointestinais. (C) potencializam a resposta nociceptiva à bradicinina, serotonina e acetilcolina. (D) possuem ação periférica e provável ação central.
29. A droga de escolha para tratamento do choque anafilático é (A) atropina. (B) dobutamina. (C) dopamina. (D) adrenalina.	37. Paciente, 4 anos de idade, será submetido à anestesia geral. O tamanho do tubo endotraqueal (diâmetro interno) mais apropriado é (A) 3,0 mm (B) 4,0 mm (C) 5,0 mm (D) 6,0 mm
30. Durante anestesia de emergência em paciente de <i>estômago cheio</i> ocorre regurgitação e aspiração do conteúdo gástrico. As características do líquido aspirado que indicam maior gravidade do quadro são (A) pH < 2,5 e volume maior do que 25 ml. (B) pH > 2,5 e volume menor do que 25 ml. (C) pH < 2,5 e volume menor do que 25 ml. (D) pH > 2,5 e volume maior do que 25 ml.	38. Dos anestésicos inalatórios abaixo, aquele que tem o maior grau de metabolismo é (A) halotano. (B) isoflurano. (C) enflurano. (D) sevoflurano.
31. Paciente, 65 anos de idade, em uso de colírio de ecotiofato para tratamento de glaucoma, é internado para apendicectomia de emergência. Dos anestésicos abaixo, aquele que tem a duração aumentada pelo uso dessa medicação é (A) propofol. (B) fentanil. (C) isoflurano. (D) succinilcolina.	39. Durante a neurocirurgia para ressecção de tumor frontal, o anesthesiologista opta pelo uso de tionebital. Os efeitos do tionebital no cérebro são (A) diminui a taxa metabólica e aumenta o fluxo sanguíneo. (B) diminui a taxa metabólica e diminui o fluxo sanguíneo. (C) aumenta a taxa metabólica e aumenta o fluxo sanguíneo. (D) aumenta a taxa metabólica e diminui o fluxo sanguíneo.
32. A melhor indicação de transfusão de crioprecipitado é (A) plaquetopenia. (B) hipofibrinogenemia. (C) deficiência de fator X. (D) deficiência de fator V.	40. A raquianestesia deve ser realizada abaixo do término da medula espinhal. A medula espinhal no adulto termina em (A) L1 / L2 (B) L2 / L3 (C) L3 / L4 (D) L4 / L5
33. É uma situação que caracteriza o estado de choque: (A) taquicardia. (B) anemia. (C) hipovolemia. (D) hipoperfusão tecidual.	
34. Pode ser causa de hipotensão arterial, após o início da ventilação mecânica, (A) pneumotórax hipertensivo. (B) alta fração inspirada de oxigênio. (C) atelectasia. (D) edema pulmonar.	